

**Rafтарهای تغذیه‌ای شیرخواران:**  
هر نوزاد و کودک در هنگام طلب شیر رفتار مخصوص به خود را ارائه می‌دهد از رفتارهای تغذیه‌ای شیرخواران میتوان موارد زیر را نام برد:

#### \***شیرخواران هیجانی:**

برخی از بچه‌ها هنگام مواجهه با پستان هیجان زده به نظر میرسند، به طور متناوب پستان را گرفته و ول می‌کنند و سپس شروع به جیغ زدن می‌نمایند. مادر چنین شیرخوارانی ابتدا باید نوزاد را بغل کرده، او را آرام نمایند؛ سپس شیرخوار را زیر پستان بگذارند. پس از چند روز مادر و نوزاد به هم عادت می‌کنند.

#### \***شیرخواران عجول:**

بعضی از شیرخواران به شدت و با عجله و بی درنگ پستان را می‌گیرند و برای مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، بسیار پرانرژی پستان را می‌مکند. این گروه از شیرخواران بازیگوشی نمی‌کنند. و به ندرت به پستان صدمه می‌زنند و اگر هم مشکلی رخ دهد پس از مدتی برطرف خواهد شد.



#### \***شیرخواران وسواسی:**

این شیرخواران اصراردارند نوک پستان را در دهان نگه دارند، کمی شیر بچشند و قبل از

این که شروع به شیر خوردن کنند دهنه‌شان را به عقب بکشند. اگر عجله کرده و یا به زور مجبور شان کنیم به شدت عصبانی شده و شروع به جیغ زدن می‌کنند. بعد از چند لحظه آرام شده و به خوبی شیر می‌خورند.

این شیرخواران به مزه شیر بسیار حساس هستند و اگر مزه شیر فرق کند شیر نخواهند خورد. مادر باید غذاهای مختلف را کم کم به غذای خود اضافه نماید تا شیرخوار به طعم‌های مختلف شیر عادت کند. یعنی مادر هر چند وقت یک بار غذای جدید بخورد.

#### \***شیرخواران تنبل (تغذیه در زمان طولانی):**

ترجیح می‌دهند چند دقیقه شیر بخورند و چند دقیقه استراحت نمایند. این شیرخواران عجله‌ای در شیر خوردن ندارند و اگر به حال خود گذاشته شوند معمولاً خوب شیر می‌خورند، گرچه زمان بیشتری برای شیر خوردن صرف می‌کنند. صبر و حوصله مادر در این شیرخواران بسیار حائز اهمیت است.



# شیر خواران

رفتارهای تغذیه‌ای



دانه ای که در آن کودک نباشد . برکت ندارد

بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) در میان واحد آموزش

**شیر خواران بانياز زیاد:**  
بسیاری از شیرخواران بیش از دیگران گریه می کنند و نیاز بیشتری به بغل کردن و حرکت دارند، پس بهتر است شیرخوار را بغل کنید و در کنار خود بخوابانید.

**بیماری یا درد:**  
از علل دیگر گریه زیاد شیرخوار قولنج، دررفتگی مفاصل، صدمه زایمان، واکسن، پیچش بیضه، ریفلاکس



**ساخر علل:**  
کهنه کثیف یا زخم بودن کشاله ران شیرخوار، گرم بودن، سرد بودن)، خستگی (ملاقات بیش از اندازه)، قرار گرفتن شیرخوار در هوای آلوده به دود سیگار تولید بیش از اندازه شیر و جریان سریع شیر، مستیت، و در آخر تولید ناکلفی شیر و جریان کم شیر از علل دیگر گریه زیاد شیرخوار می بلشد

۵

## \* علل گریه زیاد شیرخوار:

علل زیادی باعث گریه شیرخوار می شود

**تقاضای بیشتر شیرخوار برای شیرخوردن:**

در سنین حدود ۲ هفتگی، ۶ هفتگی و ۳ ماهگی شیرخوار احتمالاً به این دلیل که نسبت به قبل سریع تر رشد می کند، تقاضایش برای شیر خوردن بیشتر است.

## غذاي مادر:

گاهی اوقات مادر متوجه می شود که وقتی غذاي خاصی مصرف می کند، کودک او آشفته و بی قرار می شود.

معمول با هر غذایی ممکن است این حالت ایجاد شود لذا نمی توان اجتناب از غذاهای خاصی را به مادران توصیه کرد، مگر اینکه واقعاً با خوردن غذایی متوجه مشکلی بشوند.

بهتر است ماده مورد شک برای یک تا دو هفته از برنامه غذایی مادر حذف شود و نتیجه آن بررسی شود.

**کافئین، سیگار و داروهای مصرفی مادر** می توانند شیرخوار را بی قرار کنند. توصیه می شود مادر چای، قهوه، نوشابه گازدار، کمر بیلشامد سیگار را ترک کند.

۴



معاونت امور بهداشتی